

**Pomme de terre**  
Variété de consommation

# Agria

**Kartoffeln**  
Speisesorte

<i>Maturité</i>	mittelfrüh bis mittelspät <i>mi-précoce à mi-tardive</i>	Reifegruppe
<i>Obtenteur</i>	Kartoffelzucht Böhm AG Postfach 1968 D - 2120 Lüneburg	Züchter
<i>Ascendance</i>	Quarta x Semlo	Abstammung
<i>Inscription sur la liste officielle</i>	1988	Aufnahme in die offizielle Sortenliste
<i>Représentant</i>	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



<b>I.</b>	<b>Caractères morphologiques</b>	<b>1.</b>	<b>Morphologische Merkmale</b>
<i>Tubercule :</i>	<i>forme : oblong long à oblong court</i>	<i>Knolle :</i>	Form : langoval bis kurzoval Grösse : gross Augen : flach bis mitteltief Fleischfarbe : tiefgelb Schale : gelb, leicht genetzt
<i>Tige :</i>	<i>taille : grosse</i> <i>yeux : superficiels à mi-profonds</i> <i>chair : jaune foncé</i> <i>peau : jaune, légèrement réticulée</i>	<i>Stengel :</i>	mittelhoch, wenig zahlreich, kräftig, Achseln violett
<i>Feuille :</i>	<i>taille moyenne, peu nombreuses, vigoureuses, aisselles violettes</i>	<i>Blatt :</i>	matt, graugrün, gross
<i>Fleur :</i>	<i>mate, gris-vert, grande</i> <i>blanche, floraison abondante</i>	<i>Blüten :</i>	weiss, stark blühend

2.	<b>Caractéristiques agronomiques et technologiques</b>	2.	<b>Werteigenschaften</b>
Rendement : Calibre : Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Sucres réducteurs (teneur): Utilisation technologique :	très élevé grand moyenne à faible (13 - 15,5%) moyen à élevé B-C faible faible très faible frites, rösti	Ertrag : Kalibriererausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	sehr hoch hoch mittel bis niedrig (13 - 15,5%) mittel bis hoch B-C gering gering sehr gering Frites, Rösti
3.	<b>Sensibilité</b>	3.	<b>Anfälligkeiten</b>
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Sensibilité aux chocs : Virus de l'enroulement : Virus Y :	sensible pas sensible au pathotype Ro <sub>1</sub> moyenne faible moyenne élevée moyenne à faible moyenne à faible moyenne faible	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Schlagempfindlichkeit : Blattroll : Virus Y :	anfällig nicht anfällig (Pathotyp Ro <sub>1</sub> ) mittel gering mittel stark mittel bis gering mittel bis gering mittel gering
4. Agria	<b>Remarques particulières</b>	4. Agria	<b>Besondere Hinweise</b>
	Réfractaire au virus X. Agria a une longue dormance. La durée d'incubation est courte. Modérer la fumure azotée!		Immun gegen Virus X. Agria ist sehr keimruhig. Die Inkubationsdauer ist kurz. Zurückhaltung bei Stickstoffdüngung!

*Agria est une bonne variété qui produit de gros tubercules. Elle se consomme à l'état frais et se prête à la transformation par l'industrie alimentaire.*

Agria ist eine gute, grossfallende Speisesorte für Frischkonsum und Verarbeitung.

*Oeuvre commune des stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.*

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.