

Pomme de terre
Variété de consommation

Ditta

Kartoffeln
Speisesorte

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| <i>Maturité</i> | mittelfrüh <i>mi-précoce</i> | Reifegruppe |
| <i>Obtenteur</i> | Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft GmbH Meires, Windigsteig, Österreich | Züchter |
| <i>Ascendance</i> | Bintje x Quarta | Abstammung |
| <i>Inscription sur la liste suisse</i> | 1998 | Aufnahme in die Sortenliste |
| <i>Représentant</i> | Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley | Vertreter |



| I. | Caractères morphologiques | 1. | Morphologische Merkmale |
|--------------------|--|-----------|---|
| <i>Tubercule :</i> | <i>forme : oblongue à longue taille : moyenne yeux : superficiels à mi-superficiels chair : jaune foncé à jaune peau : jaune</i> | Knolle : | Form : langoval bis lang Grösse : mittelgrossfallend Augen : flach bis mittelflach Fleischfarbe : tiefgelb bis gelb Schale : gelb |
| <i>Tige :</i> | <i>taille moyenne, port mi-dressé avec forte pigmentation à la base des tiges</i> | Stengel : | mittelhoch, mittelaufrecht, stark pigmentierte Stengelbasis |
| <i>Feuille :</i> | | Blatt : | mittelgrün, helle Adern, zusammengewachsene Endblätter |
| <i>Fleur :</i> | <i>vert tendre, nervures claires, foliole terminale soudée crème, floraison moyennement abondante</i> | Blüten : | crème, mittelstark blühend |

| 2. | Caractéristiques agronomiques et technologiques | 2. | Werteigenschaften |
|---|---|--|--|
| <i>Rendement :</i> <i>Calibre :</i> <i>Teneur en amidon :</i> <i>Rendement amidon :</i> <i>Type culinaire :</i> <i>Altération de la couleur</i> - <i>chair crue :</i> - <i>chair cuite :</i> <i>Sucres réducteurs (teneur):</i> <i>Utilisation technologique :</i> | <i>élevé</i> <i>moyen</i> <i>moyenne (12 - 14,5%)</i> <i>moyen</i> <i>B-A</i> <i>faible</i> <i>moyenne</i> <i>moyenne</i> <i>aucune</i> | <i>Ertrag :</i> <i>Kalibrierenausbeute :</i> <i>Stärkegehalt :</i> <i>Stärkeertrag :</i> <i>Kochtyp :</i> <i>Verfärbung</i> - <i>roh :</i> - <i>gekocht :</i> <i>Reduzierende Zucker :</i> <i>Verarbeitungseignung :</i> | hoch mittel mittel (12 - 14,5%) mittel B-A niedrig mittel mittel keine |
| 3. | Sensibilités | 3. | Anfälligkeiten |
| <i>Galle verruqueuse :</i> <i>Nématodes :</i> <i>Mildiou des fanes :</i> <i>Mildiou des tubercules :</i> <i>Gale commune :</i> <i>Gale poudreuse :</i> <i>Taches de rouille :</i> <i>Virus de l'enroulement :</i> <i>Virus Y :</i> <i>Sensibilité aux chocs :</i> <i>Sensibilité à l'égermage :</i> | <i>résistante</i> <i>résistante au pathotype R₁</i> <i>moyenne</i> <i>moyenne</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>moyenne</i> <i>moyenne</i> <i>faible</i> <i>très élevée</i> | <i>Krebs :</i> <i>Nématodes :</i> <i>Krautfäule :</i> <i>Braunfäule :</i> <i>Flachschorf :</i> <i>Pulverschorf :</i> <i>Eisenfleckigkeit :</i> <i>Blattroll :</i> <i>Virus Y :</i> <i>Schlagempfindlichkeit :</i> <i>Abkeimungsempfindlichkeit :</i> | nicht anfällig nicht anfällig Pathotyp Ro ₁ mittel mittel gering gering gering mittel mittel gering sehr hoch |
| 4. | Remarques particulières | 4. | Besondere Hinweise |
| | <i>La dormance est assez longue.</i> <i>Bonne conservation.</i> | | Die Keimruhe ist ziemlich lang. Eignet sich gut für die Lagerung |
| <i>Ditta est une excellente variété de consommation à chair ferme.</i> | | Ditta ist eine gute Speisesorte mit festem Knollenfleisch. | |

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.