

Kartoffeln

Speisesorte
Reifegruppe

Züchter

Abstammung
Aufnahme in die
Sortenliste

Vertreter

Victoria

mittelfrüh bis mittelspät/
mi-précoce à mi-tardive

ZPC Holland BV
NL-8300 BD Leuwarden

Agria × Ropta J 861

2002

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
CH-1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation
Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	lang- bis kurzoval
	Grösse:	gross
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb

Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, violette Stängelbasis
---------	--

Blatt	graugrün
-------	----------

Blüten	crème, mittel bis stark blühend
--------	---------------------------------

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue à oblongue courte
	taille:	grosse
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune

Tige	de taille moyenne, port mi-dressé, violette à la base
------	--

Feuille	gris-vert
---------	-----------

Fleur	crème, floraison moyenne à abondante
-------	--------------------------------------

2. Werteigenschaften

Ertrag:	hoch
Kalibriererausbeute:	hoch
Stärkegehalt:	niedrig bis mittel (12-15,5%)
Stärkeertrag:	mittel
Kochtyp:	B
Verfärbung	
roh:	gering
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	gering (0,16 bis 0,20%, TS)
Verarbeitungseignung:	Frites
Vorkeimdauer:	5 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁)
Krautfäule:	mittel
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	mittel bis stark
Pulverschorf:	hoch
Eisenfleckigkeit:	gering bis mittel
Blattroll:	mittel
Virus Y:	stark
Schlagempfindlichkeit:	gering bis mittel
Abkeimungs-empfindlichkeit:	mittel bis stark

4. Besondere Hinweise

Keimruhe ist ausgeprägt, Knollen lagern sich gut.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	élevé
Calibre commercial:	élevé
Teneur en amidon:	moy. à faible (12-15,5%)
Rendement amidon:	moyen
Type culinaire:	B
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	faible
Sucres réducteurs	
(teneur):	faible (0,16 à 0,20%, MS)
Utilisation technologique:	frites
Prégermination:	5 semaines

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante au pathotype Ro ₁
Mildiou des fanes:	moyenne
Mildiou des tubercules:	moyenne
Gale commune:	moyenne à élevée
Gale poudreuse:	élevée
Taches de rouille:	faible à moyenne
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	élevée
Sensibilité aux chocs:	faible à moyenne
Sensibilité à l'égermage:	moyenne à élevée

4. Remarques particulières

Victoria a une bonne dormance et se conserve bien.

Victoria ist eine mittelfrühe, eher grossfallende Speisesorte mit einer sehr vielseitigen Verwendungseignung für Frites, Kartoffelstock und Rösti.

Victoria est une variété mi-précoce à mi-tardive qui produit d'assez gros tubercules. Elle convient bien à la préparation de rösti, frites, pommes nature et pommes purée.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Bern.

Œuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Berne.

