

Futtergetreide

| Sorte (Herkunft) | Körnerertrag Ext. ²⁾ / ÖLN ³⁾ | Hektolitergewicht | Frühreife beim Ähren-schieben | Frühreife bei der Ernte | Pflanzenlänge | Standfestigkeit | Proteingehalt | PUI Index | Empfohlene Saatmenge kg / a | Krankheitsresistenz | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | Mehltau | Netzflecken | Blattflecken | Gelbmosaik |

Wintergerste zweizeilige Sorten

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|----|------------|------------|------|---|----|------|---------|----|------|-------|---|
| KWS Cassia | -- / -- | ++ | spät | mittelspät | kurz | + | ++ | tief | 1,5-1,8 | ∅ | +(+) | +(+) | t |
| Maltesse | ∅ / ∅ | ++ | mittelspät | mittelspät | kurz | + | + | tief | 1,5-1,8 | ++ | +(+) | ++(+) | t |

mehrzeilige Sorten

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|------------|------------|-------------|----|---|-------------|---------|-------|------|-------|---|
| Belinda | ++ / ++ | ++ | sehr früh | mittelfrüh | lang | + | + | tief-mittel | 1,2-1,5 | ++(+) | ++ | ++ | |
| Hobbit (Hybrid) | ∅ / ∅ | +++ | mittelfrüh | mittelspät | mittel-lang | + | + | tief-mittel | 0,9-1,1 | ++(+) | +(+) | ++(+) | t |
| KWS Higgins | ++/+++ | + | mittelspät | mittelfrüh | lang | + | ∅ | tief | 1,2-1,5 | ++(+) | ∅ | +(+) | t |
| KWS Meridian | ∅ / ++ | + | mittelfrüh | mittelfrüh | mittel-lang | + | ∅ | mittel-hoch | 1,2-1,5 | ++(+) | +(+) | ++ | t |
| KWS Orbit | ++ / +++ | + | früh | mittelfrüh | mittel-lang | ++ | ∅ | tief | 1,2-1,5 | ++ | ∅ | +(+) | |
| KWS Tonic | ++ / ++ | - | früh | mittelfrüh | mittel-lang | ++ | ∅ | tief | 1,2-1,5 | ++ | ∅ | +(+) | t |
| SY Baracooda (Hybrid) | ++ / ++ | ++ | mittelfrüh | mittelspät | sehr lang | + | + | tief | 0,7-1,0 | ++(+) | + | ++ | |
| SY Galileo (Hybrid) | +++ / +++ | +++ | mittelspät | mittelfrüh | sehr lang | + | ∅ | tief | 0,7-1,0 | ++(+) | ++ | ++ | |

t = tolerant bzw. resistent gegen gewisse Pathotypen

Sommergerste

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|------------|------------|-------------|-----|---|--|---------|-----|------|-------|--|
| KWS Atrika | +++ / | +(+) | mittelspät | mittelspät | mittel-kurz | +++ | + | | 1,5-1,8 | +++ | ++ | ++ | |
| Sydney | ++ / | +(+) | mittelspät | mittelfrüh | sehr kurz | +++ | + | | 1,5-1,8 | +++ | +(+) | ++(+) | |

Wechseltriticale

| | | | | | | | | | | | Spelzenbräune | | Fusarien |
|----------------|-----|-----|-----------|------|--------|---|---|--|---------|----|---------------|------|----------|
| | | | | | | | | | | | Blatt | Ähre | Ähre |
| Villars | + / | +++ | sehr früh | früh | mittel | - | + | | 2,0-2,2 | ++ | + | ++ | + |

Wintertriticale

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|------------|------|-------------|-----|---|--|---------|-----|----|---|---|
| Balino | +++ / | ++ | mittelspät | | mittel | + | + | | 1,8-2,1 | +++ | + | + | + |
| Larossa | ++ / | ∅ | sehr früh | früh | mittel-lang | +++ | + | | 1,8-2,1 | +++ | ++ | ∅ | ∅ |

Winterhafer

| | | | | | | | | | | | Auswinterung | | |
|---------------|-----|---|------|------|--|---|---|--|---------|---|--------------|--|--|
| Eagle* | +++ | + | früh | früh | | ∅ | + | | 1,2-1,5 | + | ∅ | | |

* Angaben aus deutschen und österreichischen Sortenprüfungsergebnissen

Sommerhafer

| | | | | | | | | | | | Grünschnitt-eignung | Korn-farbe |
|---------------|-------|----|------------|------------|-----------|---|---|--|---------|----|---------------------|------------|
| Canyon | +++ / | + | mittelfrüh | mittelfrüh | sehr lang | - | ∅ | | 1,3-1,5 | ++ | + | gelb |
| Husky | ++ / | + | früh | mittelfrüh | lang | ∅ | + | | 1,3-1,5 | ++ | + | weiss |
| Typhon | ++ / | ++ | früh | mittelfrüh | lang | - | - | | 1,3-1,5 | ++ | + | gelb |

Legende:

++++ = ausgezeichnet
+++ = sehr gut
++ = gut
+ = mittel bis gut

∅ = mittel
- = mittel bis schwach
-- = schwach
--- = sehr schwach

¹⁾ Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2021. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich

²⁾ Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)

³⁾ Ergebnisse aus Praxis-Anbauversuchen (ÖLN) nur für Winter- und Futterweizen sowie Wintergerste

⁴⁾ Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, ∅, -, --)