

# Kiebitz

<b>Kartoffeln</b>		<b>Pommes de terre</b>
<b>Verarbeitungsorte</b>		<b>Variété pour l'industrie alimentaire</b>
<b>Reifegruppe</b>	früh bis mittelfrüh / précoce à mi-précoce	<b>Maturité</b>
<b>Züchter</b>	Norika	<b>Obtenteur</b>
<b>Abstammung</b>		<b>Ascendance</b>
<b>Aufnahme in die Sortenliste</b>	2017	<b>Inscription dans la liste suisse</b>
<b>Vertreter</b>	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	<b>Représentant</b>



1. Morphologische Merkmale		
<b>Knolle</b>	Form	rund, sehr regelmässig
	Grösse	mittel
	Augen	mittelflach
	Fleischfarbe	gelb
	Schale	gelb
<b>Stängel</b>	hoch, mittelaufrecht, ohne Pigmentierung	
<b>Blatt</b>	gross lanzettförmig, grün	
<b>Blüten</b>	rotviolett, schwach bis mittelblühend	

1. Caractères morphologiques		
<b>Tubercule</b>	forme	ronde, très régulière
	taille	moyenne
	yeux	mi-superficiels
	chair	jaune
	peau	jaune
<b>Tige</b>	de taille haute, mi-dressée, sans pigmentation	
<b>Feuille</b>	grande lancéolée, vert franc	
<b>Fleur</b>	rouge violacé, rare à moyenne	

# Kiebitz

## 2. Werteigenschaften

Ertrag	mittel	
Kalibrierungsbeute	mittel	
Stärkegehalt	hoch (16–18%)	
Stärkeertrag	hoch	
Kochtyp	C	
Verfärbungen	roh	mittel
	gekocht	mittel
Reduzierende Zucker	sehr gering (0,07% TS)	
Verarbeitungseignung	Chips	
Vorkeimdauer	6 Wochen	

## 3. Anfälligkeiten

Krebs	nicht anfällig
Nematoden	nicht anfällig (Ro <sub>1,4</sub> )
Krautfäule	stark
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	mittel bis gering
Pulverschorf	mittel bis stark
Eisenfleckigkeit	gering
Blattrollvirus	gering bis mittel
Virus Y	gering bis mittel
Schlagempfindlichkeit	mittel bis gering
Abkeimungsempfindlichkeit	sehr anfällig

## 4. Besondere Hinweise

Die Knollen weisen eine gute Keimruhe auf und lagern sich gut.

Kiebitz ist eine ziemlich frühreife Chipssorte mit einer ausgezeichneten Backqualität.

## 2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	moyen	
Calibre commercial	moyen	
Teneur en amidon	élevée (16–18%)	
Rendement amidon	élevé	
Type culinaire	C	
Altération de la couleur	chair crue	moyenne
	chair cuite	moyenne
Sucres réducteurs	très faibles (0,07% MS)	
Utilisation technologique	chips	
Prégermination	6 semaines	

## 3. Sensibilités

Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro <sub>1,4</sub> )
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	moyenne à faible
Gale poudreuse	moyenne à élevée
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible à moyenne
Virus Y	faible à moyenne
Sensibilité aux chocs	moyenne à faible
Sensibilité à l'égermage	très sensible

## 4. Remarques particulières

Kiebitz a une bonne dormance et ses tubercules se conservent bien.

Kiebitz est une variété plutôt précoce, avec une très bonne aptitude à la transformation en chips.